

Buccolam

Dal 1 luglio è disponibile il Buccolam (midazolam in soluzione per mucosa orale) distribuito dalla Viropharma

Da anni AICE ha promosso la richiesta di tale farmaco, ora prescrivibile dal medico specialista e, su compilazione di piano terapeutico, rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale - "**Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Buccolam». (Determina n. 376/2013)**".

Attualmente prescrivibile solo per la fascia d'età in età evolutiva - dai tre mesi a meno di 18 anni.

AICE auspica che tale farmaco o pari soluzione possa essere reso disponibile anche per sedare le crisi prolungate nell'età adulta.

UNA DATA STORICA CHE CONSOLIDA L'IMPORTANTE RISULTATO OTTENUTO DA AICE PER TUTTE LE PATOLOGIE PER LA SOMMINISTRAZIONE NON SPECIALISTICA DEI FARMACI IN ORARIC SCOLASTICO.

Grazie a questo farmaco a somministrazione orale si superano le criticità, di ordine pratico e sociale, relative **l'intrusività e l'intimità della somministrazione rettale dei farmaci sino a ieri, per fortuna comunque, disponibili.**



Non una bacchetta magica, finalmente ... un farmaco, da versare con una siringa ai lati della bocca per interrompere le crisi convulsive prolungate.

Si rafforza così la conquista AICE per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico del 2002 e del 2005 ottenuta per tutte le patologie.

AICE informati sul BUCCOLAM/midazolam
www.aice-epilessia.it

AICE conseguì, grazie alle lotte dei genitori, la disponibilità degli insegnanti e di alcuni medici, nel **2002, il primo protocollo per la Provincia di Bologna per la somministrazione dei farmaci a scuola** ottenendo poi nel 2005 a livello nazionale le **Raccomandazioni Ministeriali contenenti le Linee Guida per la somministrazione dei farmaci a scuola.**

Grazie a queste due vittorie AICE si sono evoluti recenti protocolli interistituzionali di più ampio respiro che, come quello della **Regione Emilia-Romagna** ed il conseguente della **Provincia di Bologna**, tutelano tale diritto anche in altri ambiti oltre quello scolastico.

Con una siringa senza ago e predosata a seconda delle fasce d'età, si potranno interrompere le crisi convulsive prolungate somministrando metà dose in ognuno dei due lati della bocca, tra la guancia e la gengiva.

Come tutti gli anni AICE organizza per genitori ed insegnanti i corsi di formazione per la somministrazione non specialistica dei farmaci e la gestione delle crisi epilettiche a scuola: dal prossimo anno, grazie al Buccolam, è stata superata anche la criticità della somministrazione rettale.